



# SERVIROC

## LE CATALOGUE RATICIDE

FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC** route de Quinssaines 03410 DOMERAT  
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)



## RATICIDE BLE DFC

DIFENACOUM 0,005 %

Raticide blé dfc par mouture de blé concassé pour les rats et souris.

### AVANTAGES

Permet la libre circulation de l'appât dans la nichée.  
Sans souffrance car ne provoque pas de convulsions.  
Blé concassé ne pouvant être décortiqué par la souris.  
Fortement appétant par composition en corps gras.

### RENDEMENT

Souris : 50 g par poste tout les 5 m.  
Sourmouls : 100 g par poste tout les 10 m.  
Rats noirs : 150 g par poste tout les 10 m.

### RECOMMANDATIONS

Interdire l'usage de ce produit pour la lutte contre les ragondins et les campagnols terrestres.  
Identifier correctement les rongeurs à détruire afin d'adopter le rodenticide le mieux adapté.  
Disposer les appâts sur les lieux de passages récents repérables par les crottes brillantes.  
Ne pas laisser les appâts à la portée des animaux domestiques pour éviter une intoxication.  
Disposer le produit en quantité de 2 ou 3 plaquettes par poste d'appâtage à l'abri de l'humidité.

### CARACTERISTIQUES


Aspect : Grains  
Point éclair : Sans  
Taux cov : 0 g/l  
Densité : Plus de 1 kg/l  
Teintes : Bleu  
Emission cov : cov-A+



### La fiche conseils...

**Le choix du raticide et de l'appât est généralement déterminant dans une campagne de dératisation.**

- 1 - Dératiser préventivement en début et en fin d'hiver afin d'éviter les dégâts éventuels des rongeurs.
- 2 - Repérer le type de rongeurs à détruire pour adapter au mieux le raticide et le poste d'appâtage idéal.
- 3 - Choisir de traiter le plus près possible du lieu de passage des rongeurs en repérant les crottes fraîches.
- 4 - Disposer l'anti-rat pour endormir la méfiance coutumière des rongeurs pour une efficacité accrue.
- 5 - Protéger les raticides des enfants et des animaux domestiques par des tuiles ou des tuyaux PVC.
- 6 - Eviter de ranger ou nettoyer lors du traitement pour que les rongeurs se sentent en sécurité.
- 7 - Regarnir régulièrement les zones entamées en veillant à avoir une quantité de raticide excédentaire.
- 8 - Attendre jusqu'à la fin définitive de consommation de façon à éliminer complètement les rongeurs.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**

# RATICIDE AVOINE DFC

DIFENACOUUM 0,005 %

Raticide avoine dfc sur mouture avoine décortiquée pour locaux secs.

## AVANTAGES

Efficace grâce à leur sensibilité à cette matière active.  
Sans odeur car les cadavres se déshydratent totalement.  
Avoine n'étant pas décortiquée même par la souris.  
Effet cumulatif de l'appât pour endormir leur méfiance.

## RENDEMENT

Souris : 50 g par poste tout les 5 m.  
Surmulots : 100 g par poste tout les 10 m.  
Rats noirs : 150 g par poste tout les 10 m.

## RECOMMANDATIONS

Interdire l'usage de ce produit pour la lutte contre les ragondins et les campagnols terrestres.  
Identifier correctement les rongeurs à détruire afin d'adopter le rodenticide le mieux adapté.  
Disposer les appâts sur les lieux de passages récents repérables par les crottes brillantes.  
Ne pas laisser les appâts à la portée des animaux domestiques pour éviter une intoxication.  
Disposer le produit en quantité de 2 ou 3 plaquettes par poste d'appâtage à l'abri de l'humidité.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Grains  
Point éclair : Sans  
Taux cov : 0 g/l  
Densité : Plus de 1 kg/l  
Teintes : Bleu  
Emission cov : cov-A+



## La fiche conseils...

**Le choix du raticide et de l'appât est généralement déterminant dans une campagne de dératisation.**

- 1 - Dératiser préventivement en début et en fin d'hiver afin d'éviter les dégâts éventuels des rongeurs.
- 2 - Repérer le type de rongeurs à détruire pour adapter au mieux le raticide et le poste d'appâtage idéal.
- 3 - Choisir de traiter le plus près possible du lieu de passage des rongeurs en repérant les crottes fraîches.
- 4 - Disposer l'anti-rat pour endormir la méfiance coutumière des rongeurs pour une efficacité accrue.
- 5 - Protéger les raticides des enfants et des animaux domestiques par des tuiles ou des tuyaux PVC.
- 6 - Eviter de ranger ou nettoyer lors du traitement pour que les rongeurs se sentent en sécurité.
- 7 - Regarnir régulièrement les zones entamées en veillant à avoir une quantité de raticide excédentaire.
- 8 - Attendre jusqu'à la fin définitive de consommation de façon à éliminer complètement les rongeurs.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**

# RATICIDE AVOINE BMD

BROMADIOLONE 0,005 %

Raticide avoine bmd par avoine décortiquée pour locaux secs.

## AVANTAGES

Avoine n'étant pas décortiqué même par la souris.  
Circulation de l'appât dans la nichée des rongeurs.  
Effet cumulatif afin d'endormir la méfiance des rongeurs.  
Anticoagulants de 2<sup>ème</sup> génération sans accoutumance.

## RENDEMENT

Souris : 50 g par poste tout les 5 m.  
Surmulots : 100 g par poste tout les 10 m.  
Rats noirs : 150 g par poste tout les 10 m.

## RECOMMANDATIONS

Interdire l'usage de ce produit pour la lutte contre les ragondins et les campagnols terrestres.  
Identifier correctement les rongeurs à détruire afin d'adopter le rodenticide le mieux adapté.  
Disposer les appâts sur les lieux de passages récents repérables par les crottes brillantes.  
Ne pas laisser les appâts à la portée des animaux domestiques pour éviter une intoxication.  
Disposer le produit en quantité de 2 ou 3 plaquettes par poste d'appâtage à l'abri de l'humidité.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Grains  
Point éclair : Sans  
Taux cov : 0 g/l  
Densité : Plus de 1 kg/l  
Teintes : Bleu  
Emission cov : cov-A+



## La fiche conseils...

**Le choix du raticide et de l'appât est généralement déterminant dans une campagne de dératisation.**

- 1 - Dératiser préventivement en début et en fin d'hiver afin d'éviter les dégâts éventuels des rongeurs.
- 2 - Repérer le type de rongeurs à détruire pour adapter au mieux le raticide et le poste d'appâtage idéal.
- 3 - Choisir de traiter le plus près possible du lieu de passage des rongeurs en repérant les crottes fraîches.
- 4 - Disposer l'anti-rat pour endormir la méfiance coutumière des rongeurs pour une efficacité accrue.
- 5 - Protéger les raticides des enfants et des animaux domestiques par des tuiles ou des tuyaux PVC.
- 6 - Eviter de ranger ou nettoyer lors du traitement pour que les rongeurs se sentent en sécurité.
- 7 - Regarnir régulièrement les zones entamées en veillant à avoir une quantité de raticide excédentaire.
- 8 - Attendre jusqu'à la fin définitive de consommation de façon à éliminer complètement les rongeurs.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**

# RATICIDE BLOC DFC

DIFENACOUM 0,005 %

Raticide bloc dfc par plaquette hydrofuge pour dératiser les lieux humides.

## AVANTAGES

Stabilité des plaquettes sous forme de blocs hydrofuges.  
Fortement appétente par sa composition en corps gras.  
Action lente pour la circulation de l'appât dans la nichée.  
Sans souffrance car ne provoque pas de convulsions.

## RENDEMENT

Souris : 1 bloc par poste tous les 5 m.  
Surmulots : 2 blocs par poste tous les 10 m.  
Rats noirs : 3 blocs par poste tous les 10 m.

## RECOMMANDATIONS

Interdire l'usage de ce produit pour la lutte contre les ragondins et les campagnols terrestres.  
Identifier correctement les rongeurs à détruire afin d'adopter le rodenticide le mieux adapté.  
Disposer les appâts sur les lieux de passages récents repérables par les crottes brillantes.  
Ne pas laisser les appâts à la portée des animaux domestiques pour éviter une intoxication.  
Disposer le produit en quantité de 2 ou 3 plaquettes par poste d'appâtage à l'abri de l'humidité.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide  
Point éclair : Sans  
Taux cov : 0 g/l  
Densité : Plus de 1 kg/l  
Teintes : Bleu  
Emission cov : cov-A+



## La fiche conseils...

**Le choix du raticide et de l'appât est généralement déterminant dans une campagne de dératisation.**

- 1 - Dératiser préventivement en début et en fin d'hiver afin d'éviter les dégâts éventuels des rongeurs.
- 2 - Repérer le type de rongeurs à détruire pour adapter au mieux le raticide et le poste d'appâtage idéal.
- 3 - Choisir de traiter le plus près possible du lieu de passage des rongeurs en repérant les crottes fraîches.
- 4 - Disposer l'anti-rat pour endormir la méfiance coutumière des rongeurs pour une efficacité accrue.
- 5 - Protéger les raticides des enfants et des animaux domestiques par des tuiles ou des tuyaux PVC.
- 6 - Eviter de ranger ou nettoyer lors du traitement pour que les rongeurs se sentent en sécurité.
- 7 - Regarnir régulièrement les zones entamées en veillant à avoir une quantité de raticide excédentaire.
- 8 - Attendre jusqu'à la fin définitive de consommation de façon à éliminer complètement les rongeurs.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**



## RATICIDE PATE DFC

DIFENACOUM 0,005 %

Raticide pâte dfc en sachet de pâte fraîche pour les lieux humides.

### AVANTAGES

Action multi-cibles contre les rats, souris, lérots et loirs.  
Facile d'emploi grâce à des sachets prédosés de 10 g.  
Sans méfiance des rongeurs car la mort semble naturelle.  
Très appétente à l'odorat très particulier des rongeurs.

### RENDEMENT

Souris : 2 sachets par poste tous les 5 m.  
Surmulots : 4 sachets par poste tous les 10 m.  
Rats noirs : 5 sachets par poste tous les 10 m.

### RECOMMANDATIONS

Interdire l'usage de ce produit pour la lutte contre les ragondins et les campagnols terrestres.  
Identifier correctement les rongeurs à détruire afin d'adopter le rodenticide le mieux adapté.  
Disposer les appâts sur les lieux de passages récents repérables par les crottes brillantes.  
Ne pas laisser les appâts à la portée des animaux domestiques pour éviter une intoxication.  
Disposer le produit en quantité de 2 ou 3 plaquettes par poste d'appâtage à l'abri de l'humidité.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Pâteux  
Point éclair : Sans  
Taux cov : 0 g/l  
Densité : Plus de 1 kg/l  
Teintes : Rouge  
Emission cov : cov-A+



### La fiche conseils...

**Le choix du raticide et de l'appât est généralement déterminant dans une campagne de dératisation.**

- 1 - Dératiser préventivement en début et en fin d'hiver afin d'éviter les dégâts éventuels des rongeurs.
- 2 - Repérer le type de rongeurs à détruire pour adapter au mieux le raticide et le poste d'appâtage idéal.
- 3 - Choisir de traiter le plus près possible du lieu de passage des rongeurs en repérant les crottes fraîches.
- 4 - Disposer l'anti-rat pour endormir la méfiance coutumière des rongeurs pour une efficacité accrue.
- 5 - Protéger les raticides des enfants et des animaux domestiques par des tuiles ou des tuyaux PVC.
- 6 - Eviter de ranger ou nettoyer lors du traitement pour que les rongeurs se sentent en sécurité.
- 7 - Regarnir régulièrement les zones entamées en veillant à avoir une quantité de raticide excédentaire.
- 8 - Attendre jusqu'à la fin définitive de consommation de façon à éliminer complètement les rongeurs.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**