

SERVIROC



LE CATALOGUE SERINGUE COLOSTRUM

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



SERINGUE POST SEVRAGE

OLIGOS ELEMENTS

Seringue post-sevrage pour donner du tonus pour le post-sevrage.

AVANTAGES

Recommandé tout au long de la croissance de l'animal.
Aide à la croissance grâce à un bon apport vitaminique.
Compense les carences de la ration alimentaire de base.
Protège l'organisme des maladies infectieuses.

RENDEMENT

Veaux : 60 ml 1 fois par semaine durant 30 jours.
Chevreaux : 20 ml 1 fois par semaine durant 30 jours.
Agneaux : 10 ml 1 fois par semaine durant 30 jours.

COMPOSITION

A : 900.000 UI, D3 : 150.000 UI, E : 150 UI, PP : 1.000 mg, B1 : 500 mg, B5 : 500 mg, B6 : 500 mg, Magnésium, manganèse, zinc, sodium, protéines, celluloses.

RECOMMANDATIONS

Favoriser la respiration en débarrassant les narines et la bouche du jeune veau des mucosités présentes.
Coucher le veau sur le coté avec l'antérieur sous la cage thoracique pour prévenir de toutes défaillances.
Désinfecter soigneusement le cordon ombilical avec une solution antiseptique afin d'éviter toutes infections.
Contrôler que le veau prenne au minimum 10 % de son poids dans les 24 premières heures de vie.
Prendre en compte l'état général des jeunes veaux avant d'administrer un colostrum de remplacement.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Pâteux
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Blanc
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Une seringue permet de palier à la déficience du colostrum maternel afin de renforcer l'immunité du jeune veau.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Frictionner vigoureusement le nouveau né avec un bouchon de paille afin de l'aider à se réchauffer.
- 3 - Favoriser la respiration en débarrassant les narines et la bouche du veau des mucosités présentes.
- 4 - Coucher le veau avec l'antérieur sous la cage thoracique pour prévenir des défaillances cardiaques.
- 5 - Désinfecter le cordon ombilical en le badigeonnant avec une solution antiseptique contre les infections.
- 6 - Favoriser le léchage du veau par sa mère en le soupoudrant avec un peu de sel si nécessaire.
- 7 - Contrôler que le veau prenne 10 % de son poids dans les 24 premières heures de sa naissance.
- 8 - Prendre en compte l'état général des jeunes veaux avant d'administrer un colostrum de remplacement.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



SERINGUE OVIN 1° MOIS

VITAMINES

Seringue ovin 1 mois pour bien aider le jeune bovin dès les premiers mois de sa vie.

AVANTAGES

Indispensable à la croissance et au bon développement.
Améliore l'engraissement des très jeunes animaux.
Favorise l'ossification et l'élaboration de matière osseuse.
Renforce l'organisme afin de lutter contre les maladies.

RENDEMENT

Chevreaux : 20 ml 1 fois par semaine durant 15 jours.
Agneaux : 10 ml 1 fois par semaine durant 15 jours.

COMPOSITION

A : 700.000 UI, D3 : 150.000 UI, E : 150 UI, C : 1.500 mg, PP : 1.000 mg, Colostrum, soja, acide, sorbique, protéines, matières grasses, cendres, celluloses.



La fiche conseils...

Une seringue permet de palier à la déficience du colostrum maternel afin de renforcer l'immunité du jeune ovin.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Frictionner vigoureusement le nouveau né avec un bouchon de paille afin de l'aider à se réchauffer.
- 3 - Favoriser la respiration en débarrassant les narines et la bouche de l'ovine des mucosités présentes.
- 4 - Coucher l'ovine avec l'antérieur sous la cage thoracique pour prévenir des défaillances cardiaques.
- 5 - Désinfecter le cordon ombilical en le badigeonnant avec une solution antiseptique contre les infections.
- 6 - Favoriser le léchage de l'ovine par sa mère en le soupoudrant avec un peu de sel si nécessaire.
- 7 - Contrôler que l'ovine prenne 10 % de son poids dans les 24 premières heures de sa naissance.
- 8 - Prendre en compte l'état général des jeunes ovins avant d'administrer un colostrum de remplacement.

RECOMMANDATIONS

Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux.
Favoriser la respiration en débarrassant les narines et la bouche du jeune ovin des mucosités présentes.
Coucher l'ovine sur le côté avec l'antérieur sous la cage thoracique pour prévenir de toutes défaillances.
Désinfecter soigneusement le cordon ombilical avec une solution antiseptique afin d'éviter toutes infections.
Contrôler que l'ovine prenne au minimum 10 % de son poids dans les 24 premières heures de vie.
Prendre en compte l'état général des jeunes ovins avant d'administrer un colostrum de remplacement.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Pâteux
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Blanc
Emission cov : cov-A+



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



SERINGUE VEAU 1° MOIS

VITAMINES

Seringue veau 1 mois pour aider le jeune bovin dès les premiers mois de sa vie.

AVANTAGES

Contribue à la santé pendant la période de croissance.
Apporte vitamines, oligo-éléments et acides aminés.
Diminuer les risques face aux maladies infectieuses.
Aide à la croissance en évitant les troubles osseux.

RENDEMENT

Veaux : 60 ml 1 fois par semaine durant 15 jours.

COMPOSITION

A : 800.000 UI, D3 : 160.000 UI, E : 200 UI, PP : 1.000 mg, C : 1.000 mg, Colostrum, soja, acide sorbique, protéines, matières grasses, cendres, celluloses.

RECOMMANDATIONS

Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux et des litières ainsi que la température et l'humidité.
Favoriser la respiration en débarrassant les narines et la bouche du jeune veau des mucosités présentes.
Coucher le veau sur le coté avec l'antérieur sous la cage thoracique pour prévenir de toutes défaillances.
Désinfecter soigneusement le cordon ombilical avec une solution antiseptique afin d'éviter toutes infections.
Contrôler que le veau prenne au minimum 10 % de son poids dans les 24 premières heures de vie.
Prendre en compte l'état général des jeunes veaux avant d'administrer un colostrum de remplacement.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Pâteux
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Blanc
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Une seringue permet de palier à la déficience du colostrum maternel afin de renforcer l'immunité du jeune veau.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Frictionner vigoureusement le nouveau né avec un bouchon de paille afin de l'aider à se réchauffer.
- 3 - Favoriser la respiration en débarrassant les narines et la bouche du veau des mucosités présentes.
- 4 - Coucher le veau avec l'antérieur sous la cage thoracique pour prévenir des défaillances cardiaques.
- 5 - Désinfecter le cordon ombilical en le badigeonnant avec une solution antiseptique contre les infections.
- 6 - Favoriser le léchage du veau par sa mère en le soupoudrant avec un peu de sel si nécessaire.
- 7 - Contrôler que le veau prenne 10 % de son poids dans les 24 premières heures de sa naissance.
- 8 - Prendre en compte l'état général des jeunes veaux avant d'administrer un colostrum de remplacement.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



SERINGUE OVIN NAISSANCE

COLOSTRUM

Seringue ovin naissance pour compenser les déficiences de colostrum des premières heures.

AVANTAGES

Renforce l'immunité des jeunes chevreaux ou agneaux.
Améliore fortement la teneur énergétique du colostrum.
Équilibre le métabolisme cellulaire par les antioxydants.
Colostrum protégé séronégatifs et contrôlés IBR négatifs.

RENDEMENT

Chevreaux : 20 ml par tête 1 fois dans les 6 heures.
Agneaux : 10 ml par tête 1 fois dans les 6 heures.

COMPOSITION

Colostrum IBR négatifs : 100 %, Immunoglobulines, Anticorps

RECOMMANDATIONS

Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux et des litières ainsi que la température et l'humidité.
Favoriser la respiration en débarrassant les narines et la bouche du jeune ovin des mucosités présentes.
Coucher l'agneau sur le côté avec l'antérieur sous la cage thoracique pour prévenir de toutes défaillances.
Désinfecter soigneusement le cordon ombilical avec une solution antiseptique afin d'éviter toutes infections.
Contrôler que l'agneau prenne au minimum 10 % de son poids dans les 24 premières heures de vie.
Prendre en compte l'état général des jeunes ovins avant d'administrer un colostrum de remplacement.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Pâteux
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Étiquetage : Sans
Teintes : Blanc
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Une seringue permet de palier à la déficience du colostrum maternel afin de renforcer l'immunité du jeune ovin.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Frictionner vigoureusement le nouveau né avec un bouchon de paille afin de l'aider à se réchauffer.
- 3 - Favoriser la respiration en débarrassant les narines et la bouche de l'ovin des mucosités présentes.
- 4 - Coucher l'ovin avec l'antérieur sous la cage thoracique pour prévenir des défaillances cardiaques.
- 5 - Désinfecter le cordon ombilical en le badigeonnant avec une solution antiseptique contre les infections.
- 6 - Favoriser le léchage de l'ovin par sa mère en le soupoudrant avec un peu de sel si nécessaire.
- 7 - Contrôler que l'ovin prenne 10 % de son poids dans les 24 premières heures de sa naissance.
- 8 - Prendre en compte l'état général des jeunes ovins avant d'administrer un colostrum de remplacement.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



SERINGUE VEAU NAISSANCE

COLOSTRUM

Seringue veau naissance pour les déficiences colostrum des premières heures.

AVANTAGES

renforce l'immunité face aux maladies des nouveaux nés.
Réduction des risques de mauvais lait maternel.
Améliore la qualité immunitaire du colostrum.
Colostrum protégé séronégatifs et contrôlés IBR négatifs.

RENDEMENT

Veaux : 60 ml par tête 1 fois dans les 6 heures.

COMPOSITION

Colostrum IBR négatifs : 100 %, Immunoglobulines, Anticorps

RECOMMANDATIONS

Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux et des litières ainsi que la température et l'humidité.
Favoriser la respiration en débarrassant les narines et la bouche du jeune veau des mucosités présentes.
Coucher le veau sur le coté avec l'antérieur sous la cage thoracique pour prévenir de toutes défaillances.
Désinfecter soigneusement le cordon ombilical avec une solution antiseptique afin d'éviter toutes infections.
Contrôler que le veau prenne au minimum 10 % de son poids dans les 24 premières heures de vie.
Prendre en compte l'état général des jeunes veaux avant d'administrer un colostrum de remplacement.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Pâteux
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Blanc
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Une seringue permet de palier à la déficience du colostrum maternel afin de renforcer l'immunité du jeune veau.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Frictionner vigoureusement le nouveau né avec un bouchon de paille afin de l'aider à se réchauffer.
- 3 - Favoriser la respiration en débarrassant les narines et la bouche du veau des mucosités présentes.
- 4 - Coucher le veau avec l'antérieur sous la cage thoracique pour prévenir des défaillances cardiaques.
- 5 - Désinfecter le cordon ombilical en le badigeonnant avec une solution antiseptique contre les infections.
- 6 - Favoriser le léchage du veau par sa mère en le soupoudrant avec un peu de sel si nécessaire.
- 7 - Contrôler que le veau prenne 10 % de son poids dans les 24 premières heures de sa naissance.
- 8 - Prendre en compte l'état général des jeunes veaux avant d'administrer un colostrum de remplacement.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



SERINGUE PREMIERS JOURS

COLOSTRUM

Seringue premiers jours pour aider aux défenses naturelles des premiers jours de la vie.

AVANTAGES

Utilisable dès les premiers jours de la naissance.
Renforce l'immunité des nouveaux nés en pré-natalité.
Antianémique en favorisant l'hémoglobine du sang.
Colostrum protégé séronégatifs et contrôlés IBR négatifs.

RENDEMENT

Veaux : 60 ml par tête 1 fois par jour durant 2 jours.
Chevreaux : 20 ml 1 fois par jour durant 2 jours.
Agneaux : 10 ml par tête 1 fois par jour durant 2 jours.

COMPOSITION

Colostrum IBR négatifs : 100 %, Immunoglobulines, Acides aminées, Oligo éléments, Vitamine A, D3, E, C, PP, B1, B5, B6. SPJ 5

RECOMMANDATIONS

Favoriser la respiration en débarrassant les narines et la bouche du jeune veau des mucosités présentes.
Coucher le veau sur le coté avec l'antérieur sous la cage thoracique pour prévenir de toutes défaillances.
Désinfecter soigneusement le cordon ombilical avec une solution antiseptique afin d'éviter toutes infections.
Contrôler que le veau prenne au minimum 10 % de son poids dans les 24 premières heures de vie.
Prendre en compte l'état général des jeunes veaux avant d'administrer un colostrum de remplacement.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Pâteux
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Blanc
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Une seringue permet de palier à la déficience du colostrum maternel afin de renforcer l'immunité du jeune veau.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Frictionner vigoureusement le nouveau né avec un bouchon de paille afin de l'aider à se réchauffer.
- 3 - Favoriser la respiration en débarrassant les narines et la bouche du veau des mucosités présentes.
- 4 - Coucher le veau avec l'antérieur sous la cage thoracique pour prévenir des défaillances cardiaques.
- 5 - Désinfecter le cordon ombilical en le badigeonnant avec une solution antiseptique contre les infections.
- 6 - Favoriser le léchage du veau par sa mère en le soupoudrant avec un peu de sel si nécessaire.
- 7 - Contrôler que le veau prenne 10 % de son poids dans les 24 premières heures de sa naissance.
- 8 - Prendre en compte l'état général des jeunes veaux avant d'administrer un colostrum de remplacement.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr