


SERVIROC

SERVIROC

Rte de Quinssaines 03410 DOMERAT
Tél : 04 70 28 83 33 - www.serviroc.fr

LE CATALOGUE BOLUS BOVIN



BOLUS LACTATION

MINERAUX - VITAMINES

Bolus lactation pour aider à démarrer une bonne lactation de la vache laitière.

AVANTAGES

Aide à lutter contre l'hypocalcémie post-partum.
Optimise la calcémie pour une meilleure lactation.
Augmente l'assimilation du calcium dans l'organisme.
Permet d'améliorer fortement la santé du cheptel.

RENDEMENT

2 bolus de 100 g avant le vêlage.
2 bolus de 100 g juste après le vêlage.
2 bolus de 100 g 6 heures après le vêlage.
2 bolus de 100 g 12 heures après le vêlage.

COMPOSITION

Phosphate, Sorbitol, Calcium : 25 %, Phosphore : 6 %,
Magnésium : 0.7 %, Zinc : 5.000 mg, Vitamine D3 :
125.000 UI

RECOMMANDATIONS

Ne jamais administrer le bolus à une vache couchée,
de ou stressée.

Administrer le bolus seulement lorsque l'animal est calme
et fait l'objet d'une bonne contention.

Veiller à bien dégager la langue de côté à l'aide d'un
chiffon préalablement enroulé.

Placer le lance bolus chargé à l'entrée de l'œsophage
afin de l'injecter dans le bon conduit.

Vérifier que l'animal avale bien correctement le bolus.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : Sans

Teintes : Brun

Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Un bolus bovin garantit un apport individuel constant et régulier pour chaque animal pendant 80 jours sans discontinuité.

1 - Choisir la bonne période pour la complémentation tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.

2 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.

3 - Terminer complètement le cycle de distribution préconisé avant d'entamer une nouvelle prescription.

4 - Ne pas mélanger deux traitements différents sans le conseil préalable d'un technicien spécialiste.

5 - Administrer la supplémentation seulement lorsque l'animal est calme et fait l'objet d'une bonne contention.

6 - Sélectionner le bon appareil de distribution en fonction du type et du poids de l'animal à droguer.

7 - Contrôler que l'animal avale correctement la totalité du bolus avec une déglutition complète.

8 - Surveiller que l'animal traité conserve un bon appétit afin de garder un niveau de production satisfaisant.

SERVIROC

Rte de Quinssaines 03700 MONTAIGNEY
Tel : 04 70 28 83 33 - www.serviroc.fr





BOLUS CALCIUM

MINERAUX - VITAMINES

Bolus calcium pour réduire le risque de fièvre du lait de la vache laitière.

AVANTAGES

Aide à lutter contre le risque de la fièvre du lait.
Délitement rapide du bolus en moins de 2 heures.
Assure un relargage contrôlé du calcium et phosphore.
Améliore nettement la qualité et la quantité de lait.

RENDEMENT

2 bolus de 100 g avant le vêlage.
2 bolus de 100 g juste après le vêlage.
2 bolus de 100 g 6 heures après le vêlage.
2 bolus de 100 g 12 heures après le vêlage.

COMPOSITION

Calcium : 25,4 %, Phosphore : 5,6 %, Magnésium : 0.72 %, Zinc : 5.250 mg, Vitamine D3 : 125.000 UI

RECOMMANDATIONS

Ne jamais administrer le bolus à une vache couchée, affaiblie, malade ou stressée.

bolus seulement lorsque l'animal est calme

venir à bien dégager la langue de côté à l'aide d'un chiffon préalablement enroulé.

Placer le lance bolus chargé à l'entrée de l'œsophage afin de l'injecter dans le bon conduit.

Vérifier que l'animal avale bien correctement le bolus.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : Sans

Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Un bolus bovin garantit un apport individuel constant et régulier pour chaque animal pendant 80 jours sans discontinuité.

1 - Choisir la bonne période pour la complémentation tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.

2 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.

3 - Terminer complètement le cycle de distribution préconisé avant d'entamer une nouvelle prescription.

4 - Ne pas mélanger deux traitements différents sans le conseil préalable d'un technicien spécialiste.

5 - Administrer la supplémentation seulement lorsque l'animal est calme et fait l'objet d'une bonne contention.

6 - Sélectionner le bon appareil de distribution en fonction du type et du poids de l'animal à droguer.

7 - Contrôler que l'animal avale correctement la totalité du bolus avec une déglutition complète.

8 - Surveiller que l'animal traité conserve un bon appétit afin de garder un niveau de production satisfaisant.

SERVIROC

Rte de Quinssaines 04100 Oberet
Tel : 04 70 28 83 33 - www.serviroc.fr





BOLUS VEAU

MINERAUX - OLIGO

Bolus veau pour faciliter le sevrage, favoriser l'ossification et la bonne croissance.

AVANTAGES

Indispensable à la croissance et au bon développement.
Protège efficacement l'organisme des maladies.
Favorise ossification et élaboration de matière osseuse.
Accroît la digestibilité et l'appétit des jeunes veaux.

RENDEMENT

Jeunes bovins : 1 bolus de 70 g pendant 80 jours.
Veaux 6 mois : 1 bolus de 70 g pendant 80 jours.

COMPOSITION

Zinc : 270.000 mg, Manganèse : 110.000 mg, Cuivre : 100.000 mg, Iode : 25.000 mg, Cobalt : 4.500 mg, Sélénium : 2.400 mg, Vitamine A : 5.000.000 UI, Vitamine D3 : 1.000.000 UI, Vitamine E : 20.000 mg



La fiche conseils...

Un bolus bovin garantit un apport individuel constant et régulier pour chaque animal pendant 80 jours sans discontinuité.

- 1 - Choisir la bonne période pour la complémentation tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
- 2 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
- 3 - Terminer complètement le cycle de distribution préconisé avant d'entamer une nouvelle prescription.
- 4 - Ne pas mélanger deux traitements différents sans le conseil préalable d'un technicien spécialiste.
- 5 - Administrer la supplémentation seulement lorsque l'animal est calme et fait l'objet d'une bonne contention.
- 6 - Sélectionner le bon appareil de distribution en fonction du type et du poids de l'animal à droguer.
- 7 - Contrôler que l'animal avale correctement la totalité du bolus avec une déglutition complète.
- 8 - Surveiller que l'animal traité conserve un bon appétit afin de garder un niveau de production satisfaisant.

SERVIROC

Rte de Quinssaines 04100 Ollioult
Tel : 04 70 28 83 33 - www.serviroc.fr

RECOMMANDATIONS

Distribuer 2 à 4 semaines avant et après la période prévue pour une efficacité optimum.

Distribuer le bolus seulement lorsque l'animal est calme et fait l'objet d'une bonne contention.

Venir à bien dégager la langue de côté à l'aide d'un chiffon préalablement enroulé.

Placer le lance bolus chargé à l'entrée de l'œsophage afin de l'injecter dans le bon conduit.

Vérifier que l'animal avale correctement le bolus jusqu'à une déglutition totale et complète.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : Sans

Teintes : Brun

Emission cov : cov-A+





BOLUS TOUTES SAISONS

MINERAUX - OLIGO

Bolus toutes saisons pour renforcer l'organisme et la croissance toute l'année.

AVANTAGES

Renforce les défenses contre les états de faiblesse.
Favorise une bonne hémoglobine dans le sang.
Excellent facteur de croissance évitant le rachitisme.
Participe à l'engraissement en production laitière.

RENDEMENT

Bovins adultes : 2 bolus de 75 g pendant 80 jours.
Jeunes bovins : 1 bolus de 75 g pendant 80 jours.

COMPOSITION

Zinc : 270.000 mg, Manganèse : 105.000 mg, Cuivre : 100.000 mg, Iode : 25.000 mg, Cobalt : 5.000 mg, Sélénium : 2.500 mg, Vitamine A : 5.000.000 UI, Vitamine D3 : 1.000.000 UI, Vitamine E : 20.000 mg

RECOMMANDATIONS

Distribuer 2 à 4 semaines avant et après la période prévue pour une efficacité optimum.

Distribuer le bolus seulement lorsque l'animal est calme et fait l'objet d'une bonne contention.

Venir à bien dégager la langue de côté à l'aide d'un chiffon préalablement enroulé.

Placer le lance bolus chargé à l'entrée de l'œsophage afin de l'injecter dans le bon conduit.

Vérifier que l'animal avale correctement le bolus jusqu'à une déglutition totale et complète.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : Sans

Teintes : Brun

Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Un bolus bovin garantit un apport individuel constant et régulier pour chaque animal pendant 80 jours sans discontinuité.

1 - Choisir la bonne période pour la complémentation tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.

2 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.

3 - Terminer complètement le cycle de distribution préconisé avant d'entamer une nouvelle prescription.

4 - Ne pas mélanger deux traitements différents sans le conseil préalable d'un technicien spécialiste.

5 - Administrer la supplémentation seulement lorsque l'animal est calme et fait l'objet d'une bonne contention.


6 - Sélectionner le bon appareil de distribution en fonction du type et du poids de l'animal à droguer.

7 - Contrôler que l'animal avale correctement la totalité du bolus avec une déglutition complète.

8 - Surveiller que l'animal traité conserve un bon appétit afin de garder un niveau de production satisfaisant.

SERVIROC

Rte de Quinssaines 04100 Ollioult
Tel : 04 70 28 83 33 - www.serviroc.fr





BOLUS MISE HERBE

MINERAUX - OLIGO

Bolus mise herbe pour compenser la mauvaise qualité de l'herbe en début de saison.

AVANTAGES

Participe à la digestibilité en équilibrant le PH du rumen.
Compense la faible teneur minérale de l'herbe jeune.
Régularise le système nerveux et neuromusculaire.
Activation enzymatique pour l'assimilation des aliments.

RENDEMENT

Bovins adultes : 2 bolus de 75 g pendant 80 jours.
Jeunes bovins : 1 bolus de 75 g pendant 80 jours.

COMPOSITION

Zinc : 275.000 mg, Manganèse : 110.000 mg, Cuivre : 90.000 mg, Iode : 24.000 mg, Cobalt : 5.000 mg, Sélénium : 2.500 mg, Vitamine A : 5.000.000 UI, Vitamine D3 : 1.000.000 UI, Vitamine E : 20.000 mg

RECOMMANDATIONS

Distribuer 2 à 4 semaines avant et après la période prévue pour une efficacité optimum.

Distribuer le bolus seulement lorsque l'animal est calme

et fait l'objet d'une bonne contention.

Venir à bien dégager la langue de côté à l'aide d'un chiffon préalablement enroulé.

Placer le lance bolus chargé à l'entrée de l'œsophage afin de l'injecter dans le bon conduit.

Vérifier que l'animal avale correctement le bolus jusqu'à une déglutition totale et complète.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : Sans

Teintes : Brun

Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Un bolus bovin garantit un apport individuel constant et régulier pour chaque animal pendant 80 jours sans discontinuité.

1 - Choisir la bonne période pour la complémentation tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.

2 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.

3 - Terminer complètement le cycle de distribution préconisé avant d'entamer une nouvelle prescription.

4 - Ne pas mélanger deux traitements différents sans le conseil préalable d'un technicien spécialiste.

5 - Administrer la supplémentation seulement lorsque l'animal est calme et fait l'objet d'une bonne contention.


6 - Sélectionner le bon appareil de distribution en fonction du type et du poids de l'animal à droguer.

7 - Contrôler que l'animal avale correctement la totalité du bolus avec une déglutition complète.

8 - Surveiller que l'animal traité conserve un bon appétit afin de garder un niveau de production satisfaisant.

SERVIROC

Rte de Quinssaines 04100 Ollioult
Tel : 04 70 28 83 33 - www.serviroc.fr





BOLUS HIVERNAL

MINERAUX - VITAMINES

Bolus hivernal pour bien renforcer les défenses immunitaires en hiver.

AVANTAGES

Favorise une très bonne régulation du métabolisme.
Diminue les états de faiblesse cause des maladies.
Composition riche en oligo-éléments adaptée aux bovins.
Anti-anémique régulant le système neuro musculaire.

RENDEMENT

Bovins adultes : 2 bolus de 75 g pendant 80 jours.
Jeunes bovins : 1 bolus de 75 g pendant 80 jours.

COMPOSITION

Zinc : 280.000 mg, Cuivre : 100.000 mg, Manganèse : 100.000 mg, Iode : 25.000 mg, Cobalt : 5.000 mg, Sélénium : 2.400 mg, Vitamine A : 5.000.000 UI, Vitamine D3 : 1.000.000 UI, Vitamine E : 20.000 mg



La fiche conseils...

Un bolus bovin garantit un apport individuel constant et régulier pour chaque animal pendant 80 jours sans discontinuité.

- 1 - Choisir la bonne période pour la complémentation tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
- 2 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
- 3 - Terminer complètement le cycle de distribution préconisé avant d'entamer une nouvelle prescription.
- 4 - Ne pas mélanger deux traitements différents sans le conseil préalable d'un technicien spécialiste.
- 5 - Administrer la supplémentation seulement lorsque l'animal est calme et fait l'objet d'une bonne contention.
- 6 - Sélectionner le bon appareil de distribution en fonction du type et du poids de l'animal à droguer.
- 7 - Contrôler que l'animal avale correctement la totalité du bolus avec une déglutition complète.
- 8 - Surveiller que l'animal traité conserve un bon appétit afin de garder un niveau de production satisfaisant.

SERVIROC

Rte de Quinssaines 04100 Ollioult
Tel : 04 70 28 83 33 - www.serviroc.fr


RECOMMANDATIONS

Distribuer 2 à 4 semaines avant et après la période prévue pour une efficacité optimum.
Distribuer le bolus seulement lorsque l'animal est calme et fait l'objet d'une bonne contention.
Veiller à bien dégager la langue de côté à l'aide d'un chiffon préalablement enroulé.
Placer le lance bolus chargé à l'entrée de l'œsophage afin de l'injecter dans le bon conduit.
Vérifier que l'animal avale bien correctement le bolus.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+





BOLUS TARISSEMENT

MINERAUX - VITAMINES

Bolus tarissement pour la régénération lors de période de tarissement.

AVANTAGES

Prépare l'animal à une nouvelle période de production.
Amélioration de l'état général pendant le tarissement.
Régénération mammaire pour un colostrum très riche.
Complète les rations allégées en période de tarissement.

RENDEMENT

Bovins adultes : 2 bolus de 75 g pendant 80 jours.
Jeunes bovins : 1 bolus de 75 g pendant 80 jours.

COMPOSITION

Zinc : 265.000 mg, Manganèse : 100.000 mg, Cuivre : 100.000 mg, Iode : 25.000 mg, Cobalt : 5.000 mg, Sélénium : 2.200 mg, Vitamine A : 5.000.000 UI, Vitamine E : 20.000 mg



La fiche conseils...

Un bolus bovin garantit un apport individuel constant et régulier pour chaque animal pendant 80 jours sans discontinuité.

- 1 - Choisir la bonne période pour la complémentation tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
- 2 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
- 3 - Terminer complètement le cycle de distribution préconisé avant d'entamer une nouvelle prescription.
- 4 - Ne pas mélanger deux traitements différents sans le conseil préalable d'un technicien spécialiste.
- 5 - Administrer la supplémentation seulement lorsque l'animal est calme et fait l'objet d'une bonne contention.
- 6 - Sélectionner le bon appareil de distribution en fonction du type et du poids de l'animal à droguer.
- 7 - Contrôler que l'animal avale correctement la totalité du bolus avec une déglutition complète.
- 8 - Surveiller que l'animal traité conserve un bon appétit afin de garder un niveau de production satisfaisant.

SERVIROC

Rte de Quinssaines 04100 Ombret
Tel : 04 70 28 83 33 - www.serviroc.fr

RECOMMANDATIONS

Distribuer 2 à 4 semaines avant et après la période prévue pour une efficacité optimum.

Distribuer 1 à 2 bolus seulement lorsque l'animal est calme et fait l'objet d'une bonne contention.

Venir à bien dégager la langue de côté à l'aide d'un chiffon préalablement enroulé.

Placer le lance bolus chargé à l'entrée de l'œsophage afin de l'injecter dans le bon conduit.

Vérifier que l'animal avale bien correctement le bolus.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : Sans

Teintes : Brun

Emission cov : cov-A+

